

MODE D'EMPLOI ET CONSEILS D'UTILISATION

PRÉPARATION RAPIDE AU BIBERON OU AU SEAU MULTITÉTINES :

- 1) Saupoudrer la quantité d'aliment d'allaitement soigneusement mesurée ou pesée sur l'eau chaude à 45°C minimum.
- 2) Agiter vigoureusement afin d'obtenir un mélange homogène.
- 3) Distribuer le mélange ainsi reconstitué à une température de buvée minimum de 40°C.

PRÉPARATION AU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE LAIT : DISTRIBUTION À VOLONTÉ.

Respecter une concentration constante de 160g/litre d'eau (sevrage classique) ou 170g/litre d'eau en sevrage précoce.

BIEN REFERMER LE SAC APRÈS UTILISATION ET LE CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC. TOUJOURS UTILISER DE L'EAU POTABLE ET DU MATÉRIEL PROPRE.



SEMAINE (après colostrum)	Nombre de buvée/jour	CHEVRETTES SEVRAGE CLASSIQUE		CHEVRETTES SEVRAGE PRÉCOCE	
		Volume d'eau/buvée	Aliment en g/buvée	Volume d'eau/buvée	Aliment en g/buvée
1	2	0,4	65	0,4	65
2	2	0,5	80	0,5	80
3	2	0,8	130	0,8	135
4	2	0,9	145	1,0	170
5	2	1,0	160	1,0	170
6	2	0,9	145	0,7	120
7	2	0,8	130	0,5	85
8	2	0,7	115		
9	1	0,9	145		



Pour les chevreaux de boucherie, respecter une concentration de 160g/litres d'eau puis augmenter progressivement jusqu'à 180 g/litre d'eau.

