

RIMIFLOR YEAST


Vaches laitières



Sécuriser le fonctionnement ruminal lors de la transition du nouveau maïs


L'apport de levures vivantes Actisaf Sc47® permet d'optimiser l'efficacité du fonctionnement ruminal.

Diminuer le risque d'acidose




Source : ENSAT 2003

Augmenter la valorisation des fibres



Source : publié JDS (Marden et al., 2008)

Optimiser la production



Source : Philéo

✓
« L'utilisation d'Actisaf® permet d'augmenter la production de lait de 1,9kg/j en moyenne »



Distribué par :




Franck PLARD

07 87 74 87 88

service-appro-elevage.fr

Optimiser le management du troupeau et valoriser pleinement son potentiel génétique

Maintenir la production lors des transitions alimentaires



Exemple de 2017 : Stress thermique en Normandie

Jours considérés "Stress Thermique" (+ de 22°C et 50% d'Humidité ou THI > 68)	
Nombre de jours relevé en 2017	Moyenne THI de ces jours

Perte en lait par vache (en kg)	Pour un troupeau de 70 VL en kg	Perte totale en lait avec un lait à 320€/1000L
---------------------------------	---------------------------------	--

Calvados: Station Météo de Roullours	55	75	(Valeurs de référence Roullours) 25,8°C et 64,2% d'Humidité en moyenne sur les jours "stress thermique »	101	7064	2 261 €
Orne: Station Météo d'Alençon	80	75		147	10276	3 298 €

- Les données température et humidité sont issues des stations Météo France. Les mesures sont réalisées en extérieur, ce qui n'est pas toujours le reflet de l'ambiance bâtiment.
- Les calculs ont été réalisés à partir de l'application « heat stress Phileo »
- Les valeurs économiques sont données seulement à titre indicatif