



Nouveau :
avec noyau
Axion Stim

Delta®

Gestyx® Axion®

Aliment complémentaire à lécher pour vaches en gestation

Caractéristiques

- Complémentation pratique « tout en un », qui apporte les éléments nécessaires au bon développement des fœtus.
- Contient une forte teneur en énergie pour bien valoriser les rations fibreuses et favoriser une ingestion plus rapide et plus élevée à partir du vêlage.
- Nouveau : contient des antioxydants naturels Axion® Stim.
- Hyper appétent et simple d'utilisation (libre-service). Très résistant aux intempéries.
- Contient seulement 3% d'humidité : faible dégradation des vitamines.

Composition

- Mélasse (déshydratée), oxyde de magnésium, chlorure de sodium, sulfate de sodium, phosphate monosodique, phosphate de magnésium, matière grasse végétale, carbonate de calcium.

Constituants analytiques

Protéines brutes	4,0 %	Calcium	1,8 %
Matières grasses brutes	2,5 %	Phosphore	1,3 %
Fibres brutes	0,01 %	Sodium	4,0 %
Cendres brutes	36,0 %	Magnésium	7,0 %
Sucres	32,0 %	Potassium	2,4 %
		Humidité	3,0 %

Additifs au kg

Vitamines

3a672a Vitamine A.....	150.000 U.I.
3a671 Vitamine D3	30.000 U.I.
3a700 Vitamine E (acétate d'alpha tocophéryle tot. racémique).....	3500 mg
3a300 Vitamine C	600 mg

Oligo-éléments

E4 Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté).....	1 000 mg
E4 Cuivre (chélate cuivreux de glycine, hydraté)	80 mg

3b603 Zinc (oxyde de zinc)	2 550 mg
3b607 Zinc (chélate de zinc de glycine, hydrate) ...	450 mg
3b502 Manganèse (oxyde manganéux).....	2 000 mg
3b202 Iode (iodate de calcium anhydre).....	200 mg
E8 Sélénium (sélénite de sodium)	18 mg
3b8.12 Sélénium (sélénométhionine CNCMI-3399)	2 mg
3b304 Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II)) ..	13 mg

Anti-oxygènes

E310 Gallate de propyle	2,0 mg
-------------------------------	--------

Mode d'emploi

- Distribuer uniquement aux bovins disposant d'un rumen fonctionnel. En raison des teneurs élevées en vitamine A, D3 et oligo-éléments, limiter la distribution à hauteur de 1,5 % de la ration journalière.
- Mettre à disposition des vaches, en libre service, à proximité d'un point d'eau, de préférence dans une zone ombragée, à l'abri du soleil direct, pendant les 4 semaines qui précèdent le vêlage.
- Prévoir un cube pour 10 vaches environ. Compter sur des consommations moyennes de 150 à 250 g par jour.

Recommandations

- Ne pas distribuer aux ovins : présence de cuivre

Conservation

- 24 mois, dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur.

