

DIF'ACTIV HYDROXY

ALIMENT MINÉRAL DIÉTÉTIQUE (BOLUS) POUR BOVINS

OBJECTIF NUTRITIONNEL : APPORT PROLONGÉ EN OLIGO-ÉLÉMENTS ET VITAMINES
CHEZ LES ANIMAUX D'HERBAGE



COMPOSITION

Matières grasses de colza hydrogénées, Sels d'acide stéarique

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Calcium	0,2 %
Sodium	0,1 %
Phosphore	0,0 %
Magnésium	0,0 %

ADDITIFS au bolus

OLIGO-ÉLÉMENTS

3b303 Cobalt (carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt (II) monohydraté : 300mg - Soit 1,3 mg/jour

3b404 Cuivre (oxyde de cuivre (I)) :

5 625mg - Soit 23,4 mg/jour

3b409 Cuivre (trihydroxychlorure de dicuivre) :

2 835mg - Soit 11,8 mg/jour

3b202 Iode (iodate de calcium anhydre) :

1 125mg - Soit 4,7 mg/jour

3b502 Manganèse (Oxyde de manganèse (II)) :

4 650mg - Soit 19,4 mg/jour

3b507 Manganèse (trihydroxyde de chlorure de dimanganèse) : 1 875mg - Soit 7,8 mg/jour

3b801 Sélénium (sélénite de Na) :

225mg - Soit 0,9 mg/jour

3b603 Zinc (oxyde de zinc) :

15 750mg - Soit 65,6 mg/jour

3b609 Zinc (hydroxychlorure de zinc monohydraté) : 5 040mg - Soit 21 mg/jour

VITAMINES

3a672a Vitamine A (acétate de rétinol) :

225 000 UI - Soit 937,5 UI/jour

3a671 Vitamine D3 (acétate de rétinol) :

75 000 UI - Soit 312,5 UI/jour

3a700i Vitamine E (acétate de tout-rac-

alpha-tocophéryle) : 1 875 UI - Soit 7,8 UI/jour

MODE D'EMPLOI

Administrer à l'aide d'un applicateur adapté.

- Sur vache allaitante :

- A la mise en pâturage

- A l'entrée en stabulation si la minéralisation n'est pas possible

Administrer 2 bolus par animal sur la période considérable.

- Sur vache laitière et génisse :

Administrer 1 à 2 bolus par animal de plus de 400kg.

Durée de délitement : 240 jours

AUTRES INDICATIONS

La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.

Avant utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet du dosage des oligo-éléments dans la ration journalière et du statut en oligo-éléments du troupeau.

Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation et voie dermique.

Ne pas administrer à un animal couché

DLUO : 24 mois

**Boîte de 16 bolus
de 75 g**

